20^e Journée de pathologie infectieuse pédiatrique ambulatoire

QUE NOUS ONT APPRIS LES ÉTUDES ACTIV EN PATHOLOGIE INFECTIEUSE CETTE ANNÉE ?

Corinne Levy
Emmanuelle Varon

Devinez de quoi nous allons parler ?

Antoine Andremont
Michel Tibon-Cornillot

Le Triomphe des bactéries
La fin des antibiotiques ?

Max Milo
L'inconnu

2007

1999

2014

Cette année, selon vous la résistance des Pneumocoques et des *H. influenzae* a-t'elle ?

Augmenté

Diminué (Bonne nouvelle !)

Fait preuve d'une stabilité exemplaire

J'en sais rien

La lune de miel continue...

Pneumocoque : Résistance à la pénicilline

OMA fébrile ± douloureuse 9120 enfants

H. influenzae : Portage et résistance

900 pvts / an, enfants ayant une OMA

S. aureus : Portage et résistance

Enfants de 6 à 24 mois:

6% de porteurs si OMA et 11% si témoins

Selon vous, quelle est la bactérie la plus fréquemment retrouvée dans les prélèvements d'otorrhée chez l'enfant de moins de 3 ans ?

Pneumocoque

H. influenzae

S. aureus

Streptocoque de groupe A

Selon vous, quelle est la bactérie la plus fréquemment retrouvée dans les prélèvements d'otorrhée chez l'enfant de plus de 3 ans ?

Pneumocoque

H. influenzae

S. aureus

Streptocoque de groupe A

Etude Otorrhée

**Etude
Otorrhée
2016**

- Mise en place automne 2015
- 42 pédiatres ACTIV/AFPA
- 232 prélèvements
- Age moyen 27,7 mois $\pm$ 22,4
- Médiane 21 mois

Résultats

**Etude
Otorrhée
2016**

- $P = 0,01$, pvts + < 3 ans vs pvts + ≥ 3 ans
- **Positif** = au moins un otopathogène : Sp, Hi, Bc, SGA

< 3 ans, n = 168 (73%)

≥ 3 ans, n = 64 (28%)

MÉTAGÉNOMIQUE ?

Résultats positifs

Etude Otorrhée 2016

- ◆ Hi= 56%
- ◆ Sp=32%
- ◆ SGA=25%

< 3 ans : 83 pvts +

Résultats positifs

Etude
Otorrhée
2016

- ◆ Hi= 56%
- ◆ Sp=32%
- ◆ SGA=25%

< 3 ans : 83 pvts +

- ◆ Hi= 25%
- ◆ Sp=15%
- ◆ SGA=65%

≥ 3 ans, 20 pvts +

Sérotypes et CMI Peni

< 3 ans 26 / 27 sérotypes connus	
Sérotypes	CMI Péni
3 (n=3)	≤0,032
19F (n=2)	≤0,75
19A (n=2)	0,016
10A (n=3)	≤0,016
16F (n=3)	≤0,016
11A (n=3)	≤0,023
23B (n=2)	0,064
24F (n=2)	≤0,5
15A	1
33F	0,016
23A	0,016
15C	0,016
NT	0,012
21	0,008

≥ 3 ans 3 Sp	
Sérotypes	CMI Péni
3 (n=2)	≤0,012
35B	0,25

Distribution des sérotypes otorrhée/portage (années 2015/2016)

Résistance Hi prélèvements Otorrhée

	Paracentèses		Otorrhées
N (%)	Pre-PCV13 2007 – 2009 % [IC95%]	Post-PCV13 2011 - 2014	2015 - 2016
Hi	N = 45	N = 22	N = 53
% β +	16% [8%;29%]	9% [3%;28%]	<u>17%</u> [9%;29%]
% BLNAR	33% [21%;48%]	14% [5%;33%]	8% [3%;18%]
β + et BLNAR	11%	0	4%

Selon vous, quel est l'impact du Prevenar® sur les méningites à Pneumocoque parmi les patients ayant des facteurs de risque de pathologie invasive ?

Très bon

Bon

Je ne m'étais jamais posé la question
mais maintenant que vous la posez....

Pas d'impact

Robert Cohen^{a,b,c,d,e,*}, Emmanuelle Varon^f, Stéphane Béchét^{b,d}, Stéphane Bonacorsi^{g,h}, Corinne Levy^{a,b,c,d,*}^a Université Paris Est, IMRB-GRC GEMINI, 94000 Créteil, France^b Clinical Research Center (CRC), Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil, Créteil, France^c GPIP, Pediatric Infectious Disease Group, France^d ACTIV, Pediatric Clinical and Therapeutical Association of the Val de Marne, Saint-Maur des Fossés, France^e Unité Court Séjour, Petits Nourrissons, Service de Néonatalogie, Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil, France^f National Reference Center for Pneumococci, Laboratoire de Microbiologie, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, Hôpital Européen Georges-Pompidou, Paris, France^g Univ Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité, France^h Service de Microbiologie, Hôpital Robert-Debré, AP-HP, 75019 Paris, France

Septembre 2016

1 582 méningites à pneumocoque (2001 à 2014)

Distribution des méningites à pneumocoque en fonction de la présence de facteurs de risque

Le nombre de patients ayant un FDR et une méningite à pneumocoque est resté stable après l'introduction des PCVs.

Prévalence de méningites à pneumocoque avec facteur de risque par sérotype

Data are percentage (95% CI).

Other = all non vaccine serotypes < 12 cases

Les sérotypes vaccinaux (PCV13) ont diminué de 68% dans cette population.

On retiendra...

- +++ impact du Prevenar® sur les méningites à pneumocoque.
- Mais changement de profil : si le nombre de méningites à pneumocoque chez les enfants vulnérables est resté stable, les sérotypes vaccinaux (PCV13) ont diminué de 68% .
(Cohen R. vaccine 2015)
- **En post PCV13, les sérotypes circulants sont : non vaccinaux à faible pouvoir invasif**
 - La méningite à pneumocoque devient une infection plus rare... si elle survient
→ **chercher ++++ la pathologie sous-jacente**

(Pelton SI. CID 2014)

Selon vous le portage des *E. coli* BLSE a-t'il ?

Augmenté (encore...)

Diminué (bonne nouvelle !)

Fait preuve d'une stabilité exemplaire

J'en sais rien

Situation mondiale BLSE

FIGURE 1-2: Percentage of extended-spectrum beta-lactamase producing *Escherichia coli, by country (most recent year, 2011–2014)**

Source: CDDEP 2015, WHO 2014 and PAHO, forthcoming

Center for Disease Dynamics, Economics & Policy

Résistance *E. coli*

- Portage intestinal = Réservoir potentiel d'infections extra-intestinales à entérobactéries productrices de BLSE
- Octobre 2010 à Juin 2016
- 18 pédiatres
- 2 403 enfants prélevés

Birgy et al. BMC Infectious Diseases 2012, 12:315
<http://www.biomedcentral.com/1471-2334/12/315>

RESEARCH ARTICLE

Open Access

Community faecal carriage of extended-spectrum beta-lactamase-producing *Enterobacteriaceae* in french children

André Birgy¹, Robert Cohen², Corinne Levy², Philippe Bidet¹, Céline Courroux¹, Mohamed Benani², Franck Thollot³ and Edouard Bingen^{1,4*}

Journal of Antimicrobial Chemotherapy Advance Access published June 20, 2016

J Antimicrob Chemother
 doi:10.1093/jac/dkw219

Journal of
 Antimicrobial
 Chemotherapy

ESBL-producing *Escherichia coli* ST131 versus non-ST131: evolution and risk factors of carriage among French children in the community between 2010 and 2015

André Birgy^{1,3}, Corinne Levy^{4,5}, Philippe Bidet^{1,3}, Franck Thollot^{6,7}, Véronique Derka⁸, Stéphane Béchet⁴, Patricia Mariani-Kurkdjian⁹, Robert Cohen^{6,8} and Stéphane Bonacorsi^{1,3*}

¹IAME, UMR 1137, INSERM, F-75018 Paris, France; ²IAME, UMR 1137, Univ Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité, F-75018 Paris, France; ³AP-HP, Laboratoire de Microbiologie, Centre National de Référence associé *Escherichia coli*, Hôpital Robert-Debré, F-75019 Paris, France; ⁴Association Clinique Thérapeutique Infectieuse du Val de Marne (ACTIV), Saint Maurice Fossés, France; ⁵Groupe de Pathologie Infectieuse Pédiatrique (GPIP), Paris, France; ⁶Centre de Recherche Clinique du Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil, Créteil, France; ⁷Association Française de Pédiatrie Ambulatoire (AFPA), Paris, France; ⁸Unité court Séjour, Pédiatrie Nutrition, Service de Néonatalogie, Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil, Créteil, France

Infections Urinaires à Enterobactéries BLSE

Principaux résultats (1)

- L'infection urinaire à E-BLSE devient un problème de + en + fréquent :
234 cas répertoriés dans 24 services pédiatriques
- Survient aussi chez des enfants sans FDR dans **15%**
- *E. coli* est le germe le plus fréquent (**≈ 90%**)
- Les pénèmes peuvent être épargnés dans de nombreux cas :
2 molécules : amikacine (1 seule injection/jour) et piperacilline-tazobactam restent actives sur > 2/3 des cas.

Livermore DM JAC 2011
Wagenlehner FM Lancet 2015
Zhanell GG Drugs 2013

Principaux résultats (2)

- **Un relais oral** est possible dans la grande majorité des cas :
 - Cotrimoxazole S dans **30%** cas
 - Ciprofloxacin S si cotrimoxazole est R dans **42%** cas
 - La vaste majorité des souches restantes sont sensibles à l'association clavulanate-cefixime (113 souches testées par E-test (CNR) :
 - ≤ 1 mg/L : 95%

Bingen E J Clin Microbiol 2012
Madhi F PIDJ 2013

Principaux résultats (3)

- IUF traitées de façon « inadéquate » présentent un délai d'apyrexie similaire à celles ayant reçu un traitement efficace.

- Évolution spontanée de l'infection ?
- Concentration en ATB est suffisante dans le sang et parenchyme rénal ?
- Concentration des ATB dans les urines très élevée ?

Remerciements à tous ceux qui travaillent avec nous!