


ACTUALITÉS ÉPIDÉMIOLOGIQUES

Daniel Lévy-Bruhl – Santé publique France


Journée d'information et de préparation de la SEV – 16 mars 2017

Taux de déclaration de tuberculose chez les enfants de moins de 5 ans selon la forme de tuberculose, France, 2001-2015




(Source, Santé publique France, Déclaration obligatoire 2015; Insee, estimations localisées de population 2015)

Taux de déclaration de tuberculose chez les enfants de moins de 5 ans selon la forme de tuberculose, Ile-de-France, 2001-2015




(Source, Santé publique France, Déclaration obligatoire 2015; Insee, estimations localisées de population 2015)

Taux de déclaration de tuberculose chez les enfants de moins de 5 ans selon la forme de tuberculose, France métropolitaine hors Ile-de-France, 2001-2015



(Source, Santé publique France, Déclaration obligatoire 2015; Insee, estimations localisées de population 2015)

Diphtérie : Nombre de cas et de décès en France, 1945-2015




■ Décès déclarés (Source : Causes médicales de décès)

— Cas déclarés (Source : Déclaration obligatoire)

Tétanos : cas déclarés et décès France, 1960-2016


Nombre de cas et de
décès




Données Renacoq 1996-2016* (coqueluche à l'hôpital)

* données provisoires avec 20 hôpitaux participants


Entre 2004 et 2012, plus de 400 cas < 3 mois évitables non évités
Entre 1996 et 2012, 1050 cas évitables non évités chez enfants 3 mois et plus



Evolution de l'incidence des méningites à *Haemophilus influenzae* chez les enfants de moins de 5 ans, 1991-2015, Epibac, France métropolitaine.




Incidence des infections invasives à pneumocoque et couverture vaccinale à 2 ans avec le vaccin conjugué, évolution des années 1998-2002 à 2015



Sources : Epibac, CNRP, Estimation de la couverture vaccinale à partir des données de l'échantillon généraliste des bénéficiaires (L. Fonteneau, Santé publique France)

Impact du PCV 13-valent sur les infections invasives, par groupe de sérotype, enfants < 2 ans, France 2001-2015



Cas de rougeole déclarés en France (Janvier 2008 – Décembre 2016)

24 000 cas déclarés ($\pm 15\ 000$ en 2011)


1 500 pneumopathies graves

34 complications neurologiques

10 décès


(31 encéphalites, 1 myélite, 2 Guillain-Barré)

nb de cas




Source: Santé Publique France, déclarations obligatoires

Incidence départementale des cas de rougeole déclarés, France, 2016




Evolution du ratio infections rubéoleuses chez les femmes enceintes / naissances vivantes France, 1976-2015




Infection rubéoleuse maternelle: issues de grossesse

Réseau RENARUB – 1997 à 2015



Taux de notification des infections invasives à méningocoque liées aux principaux sérogroupes, France entière, 2000-2016



Taux de notification des infections invasives à méningocoque de sérogroupe C, France entière, 2006-2016

Entre 2011 et 2016, 308 cas d'IIM C chez des sujets de 1 an à 24 ans dont 298 non vaccinés parmi lesquels 29 décès ont été rapportés

